



NORTH DAKOTA DEPARTAMENTO DE SALUD
Programa de Planificación Familiar

CONSENTIMIENTO PARA IMPLANON

Nombre: _____ Número de Expediente: _____

BENEFICIOS: Elijo voluntariamente el uso de Implanon como mi método anticonceptivo. Implanon funciona por tres años. Implanon es del 99 por ciento a 100 por ciento de efectividad. Implanon puede ser utilizado por las madres que amamantan.

RIESGOS Y EFECTOS SECUNDARIOS: Soy consciente de que durante el uso de Implanon como método anticonceptivo, los siguientes efectos secundarios puede ocurrir:

- *Irregularidades en el sangrado
- *Cambios de humor
- *Dolor en los senos
- *Dolor o irritación cerca de la zona de la implantación
- *Vaginitis
- *Aumento de peso
- *Infecciones en el sitio del implante
- *Problemas con el uso de de los lentes de contacto
- *Acné
- *Oscurecimiento de la piel, especialmente en la cara
- *Dolores de cabeza
- *Vello en cara y cuerpo
- *Depresión
- *Infecciones virales como el resfriado, dolor de garganta, infecciones de los senos o síntomas parecidos a la gripe

El uso de tabaco aumenta el riesgo de graves efectos secundarios cardiovasculares. Entiendo que ciertos medicamentos (principalmente medicamentos para las convulsiones, la hierba de San Juan y inhibidores de la proteasa (anti-VIH) pueden hacer que el Implanon sea menos eficaz.

Me han dicho que a fin de disminuir la posibilidad de complicaciones graves de mi Implanon, que es mi responsabilidad de ir a la clínica de planificación familiar, a un médico o ir a la sala de emergencias de un hospital si comienza a tener **LAS SEÑALES DE PELIGRO** siguientes:

- *Dolor agudo en el pecho, un dolor opresivo en el pecho
- *Coloración amarillenta de piel
- *Sangrado vaginal abundante o pesadez en el pecho
- *Bultos en los senos
- *Pus o sangrado en el sitio de inserción
- *El dolor severo, inflamación o
- *Dificultad para respirar o tos con sangre
- *sensibilidad en el abdomen
- *Ruptura del implante a través de la piel
- *Dolor persistente en la pantorrilla de la pierna
- *Repentinos o fuertes dolores de cabeza o vómitos, mareos o desmayos
- *Problemas con el habla, la visión, debilidad o entumecimiento en los brazos o las piernas
- *Dificultad para dormir, debilidad, falta de energía, cansancio o tristeza

ALTERNATIVOS: Los otros medios anticonceptivos se han explicado a mí. Entiendo que la esterilización (método permanente), las píldoras anticonceptivas, el parche, el anillo, el diafragma, espuma anticonceptiva (sola), los condones, espumas y condones (en combinación), el DMPA (Depo Provera), y la planificación familiar natural son muy eficaces métodos anticonceptivos que están también disponibles.

INSTRUCCIONES para Implanon se me han dado, y me han dado la información del producto. Entiendo cómo Implanon se inserta y se retira. Entiendo que Implanon se haga efectiva en menos de 24 horas después de la inserción si está insertado dentro de los primeros cinco días de un ciclo menstrual normal y que es válida por tres años y debe ser quitada por un médico que ha tenido la experiencia de retirar Implanon. Entiendo que puede ser difícil de remover el Implanon.

[]

Entiendo que Implanon no protege contra las infecciones de transmisión sexual. He recibido instrucciones sobre el cuidado de la zona después de la inserción y la necesidad de atención médica de seguimiento.

DECISIÓN DE NO SEGUIR UTILIZANDO IMPLANON: Me han dicho que puedo tener mi Implanon removido en cualquier momento por un clínico médico calificado. Remoción requiere anestesia local y una pequeña incisión. Normalmente hay un cargo adicional médica para su eliminación. Entiendo que la fertilidad puede regresar inmediatamente después de que la varilla se ha eliminado.

INSERCIÓN: La varilla de Implanon es de aproximadamente 4 centímetros de largo y 2 milímetros de ancho. Se inserta bajo la piel de su brazo a través de una incisión de 1/8 de pulgada. La anestesia local se utiliza antes de la inserción para adormecer la piel temporalmente. Algunos hematomas pueden ocurrir en el área de inserción, pero deben desaparecer en poco tiempo. La incisión será protegida por un vendaje durante los primeros días. El sitio por lo general se cura rápidamente. Mínima o ninguna cicatrización se espera. Usted será capaz de sentir la varilla de Implanon, y debe ser visible bajo la piel.

PREGUNTAS: Se me ha dado la oportunidad de hacer preguntas acerca de Implanon y sobre la forma de consentimiento.

Firma de la Clienta

Fecha

Testigo

Fecha

[]